

კაზის წამლობის ზოგადი სქემა

	განვითარების სტადია (წამლობის ჩატარების პერიოდი)	მავნე ობიექტი (დაავადება, მავნებელი)	პასტიცილის ტიპი	მცენარეთა დაცვის საშუალება	1 ჰექტარზე საჭირო პრაქტიკის რაოდენობა
	ფოთლების გაშლისას	შავი ლაქიანობა	ფუნგიციდი	ანტრაკოლი®	1,5 კგ.
		ტკიპა	აკარიციდი	ენვიდორი®	0,3 ლ.
I	5-6 ფოთოლი	ჭრაქი, შავი ლაქიანობა	ფუნგიციდი	პასადოლი®	1,5 კგ.
II	8-10 ფოთოლი	ჭრაქი	ფუნგიციდი	არმეთილი®	2,5 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	ფალკონი®	0,3 ლ.
		მასიური სარეველები	ჰერბიციდი	რუმბო®	2,0 ლ.
III	ყვავილობის წინ	ჭრაქი	ფუნგიციდი	მელოდი® დუო	2,5 კგ.
		ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	ფუნგიციდი	ბატო® სტარი	0,5 ლ.
		ყურძნის ჭია	ინსექტიციდი	დეცის® პროფი	0,05 კგ.
IV	ყვავილობის შემდეგ	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე	ფუნგიციდი	მიკალ® ფლეში	3,5 კგ.
		ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	ფუნგიციდი	ნატივო®	0,16 კგ.
V	გამოხორბვლისას	ჭრაქი, წითელი ლაქიანობა	ფუნგიციდი	მელოდი® კომპაქტი	1,5 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	პროსპერი®	1,2 ლ.
		ყურძნის ჭია	ინსექტიციდი	დეცის® პროფი	0,05 კგ.
VI	10-12 დღის შემდგომ	ჭრაქი, შავი სიდამპლე ანთრაქნოზი	ფუნგიციდი	კუპერტინ სუპერი®	4,0 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	ფალკონი®	0,4 ლ.
		მასიური სარეველები	ჰერბიციდი	რუმბო®	3,0 ლ.
VII	10-12 დღის შემდგომ	ჭრაქი	ფუნგიციდი	პროფაილერი®	3,0 კგ.
		ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	ფუნგიციდი	ნატივო®	0,18 კგ.
VIII	10-12 დღის შემდგომ	ჭრაქი, შავი სიდამპლე ანთრაქნოზი	ფუნგიციდი	კუპერტინ სუპერი®	4,0 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	ფალკონი®	0,4 ლ.
IX	10-12 დღის შემდგომ	ჭრაქი, ბაქტერიული დაავადებები	ფუნგიციდი	იროკო® (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	2,5 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი® (გოგირდი)	5,0 კგ.
X	10-12 დღის შემდგომ	ჭრაქი, ბაქტერიული დაავადებები	ფუნგიციდი	იროკო® (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	2,5 კგ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი® (გოგირდი)	5,0 კგ.
XI	შეთვალისას	ჭრაქი, ბაქტერიული დაავადებები	ფუნგიციდი	იროკო® (სპილენძის ჰიდროქსიდი)	2,5 კგ.
		ყურძნის ჭია	ინსექტიციდი	დეცის® პროფი	0,05 კგ.

შენიშვნა: მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან შემცირდეს ჯერადობა!

განმარტებანი: ჰერბიციდი რუმბო® დოზა დაანგარიშებულია მხოლოდ ბოლებრივად ძირების გარშემო განვითარებული სარეველების წინააღმდეგ.

ფოთლების გაშლისას, ტკიპის გამონეჩის საშიშროებისას, შესხურდება - ენვიდორი® 0.3 ლ/ჰა, რომელსაც შავი ლაქიანობის წინააღმდეგ დაემატება ანტრაკოლი® 1,5 კგ/ჰა-ზე.

იმ ნაკვეთებში, სადაც კერობრივად ცრუფარიანას მავნეობა აღინიშნება, ყვავილობის შემდეგ ყურძნის მარცვლების ბარდის მარცვლების ზომის მიღწევისას, შესხურდება ინსექტიციდი მოვენტო 1,5 ლ/ჰა-ზე ნორმით. მავნებლის ნაშთების გამონეჩისას მონაცვლეობაში ჩატარდება წამლობა პირიფოსი®-თ 1,5 ლ/ჰა.

ყურძნის სიდამპლისადმი მიდრეკილ ნაკვეთებში, ან როცა რთველი ჭიანურდება და კიდევ საჭიროა ყურძნის შენახვა, შეთვალისას მტევნის არეში შესხურდება ტელდორი®-ს ან სკალა®-ს სუსპენზია განსხვავებული ნორმებით.